

Femi Blase®

Blasenentzündung

MANNOSE

- Unterstützt die Behandlung von Blasenentzündungen und Harnwegsinfektionen
- Beugt wiederkehrenden Blasen- und Harnwegsinfektionen vor, die durch E.coli verursacht werden

Allgemeiner Hinweis:

Lesen Sie sich vor der Einnahme von **tetesept Femi Blase® Blasenentzündung Mannose** die Gebrauchsinformation sorgfältig durch.

Anwendung:

tetesept Femi Blase® Blasenentzündung Mannose dient der unterstützenden Behandlung von durch E. coli verursachten Harnwegsinfektionen der Blase und der Vorbeugung von wiederkehrenden Harnwegsinfektionen und Blasenentzündungen.

Symptome einer Blasenentzündung sind:

- Brennendes oder schmerzhaftes Gefühl beim Wasserlassen
- Starker Harndrang
- Häufiges Wasserlassen
- Unterleibsschmerzen

Dosierung und Anwendung für Erwachsene und Jugendliche im Alter von mindestens 18 Jahren:



Zur vorbeugenden Anwendung: einmal täglich 1 Beutel. Zur unterstützenden Behandlung: zweimal täglich 1 Beutel. Pulver in ein Glas füllen und mit Wasser (200 ml) anrühren. Trinken Sie die Mischung sofort nach dem Anrühren aus. Zur oralen Anwendung. Die tägliche Dosisvorgabe darf nicht überschritten werden.

Anwendungsdauer:

tetesept Femi Blase® Blasenentzündung Mannose darf nicht länger als 30 Tage pro Behandlungszeitraum eingenommen werden. Die Behandlung kann nach 4 Tagen fortgesetzt werden.

Wirkmechanismus:

D-Mannose ist ein aktiver Wirkstoff mit wissenschaftlich belegter Wirksamkeit. D-Mannose bindet E.coli-Bakterien und verhindert so, dass sich diese an den Schleimhäuten des Harntrakts festsetzen. Dadurch werden die Bakterien auf einfache Weise beim Wasserlassen aus dem Körper herausgespült.



Nebenwirkung(en):

tetesept Femi Blase® Blasenentzündung Mannose ist gut verträglich und hat nur wenige Nebenwirkungen. In seltenen Fällen kann es zum Auftreten von Durchfall kommen.

Anwendung in der Schwangerschaft und/oder Stillzeit:

Zur Anwendung von D-Mannose in Schwangerschaft oder Stillzeit liegen keine Daten vor. Daher dürfen Sie dieses Produkt nicht in der Schwangerschaft oder Stillzeit anwenden.



Warnhinweise:

- Wenden Sie das Produkt nicht an, wenn Sie auf irgendeinen der Bestandteile allergisch reagieren.
- Bei Überdosierung können Nebenwirkungen wie Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall auftreten.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Bei Auftreten allergischer Reaktionen muss die Anwendung von tetesept Femi Blase® sofort beendet werden.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn:

- Sie Blutspuren in Ihrem Urin feststellen.
- die Symptome länger als 7 Tage anhalten oder schlimmer werden.
- Sie bereits an einer anderen Erkrankung leiden oder andere Medikamente nehmen.
- bei Ihnen Symptome einer Blaseninfektion oder einer Infektion der oberen Harnwege auftreten, z.B. Fieber ab 38°C oder unkontrollierbarer Schüttelfrost, Übelkeit (Brechreiz), Erbrechen oder Durchfall. Möglicherweise leiden Sie an einer Infektion der oberen Harnwege, die einer zusätzlichen Behandlung bedarf.
- bereits zu einem früheren Zeitpunkt Nierensteine bei Ihnen festgestellt wurden.
- Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen.

Zusammensetzung:

D-Mannose, Dextrose, Sorbitol, Inulin, Trikalziumphosphat, Cranberry, Magnesiumstearat, Stevia.

Beutelinhalt:

2000 mg D-Mannose

Inhalt:

8 Beutel



Aufbewahrungshinweise:

Bewahren Sie das Produkt bei Raumtemperatur (5 – 25 °C) an einem trockenen und dunklen Ort in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Haltbarkeitsdatum:

Verwenden Sie tetesept Femi Blase® nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatum.

Medizinprodukt:

tetesept Femi Blase® ist ein Klasse-IIa-Medizinprodukt in Einklang mit der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EWG.

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Unterseite der Verpackung abgedruckt.

Datum der letzten Revision dieser Anwendungshinweise:

09/2019

V 1.1

Hersteller:



PK Benelux BV,
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Vertrieb:



tetesept
pharma gmbh
Marschnerstraße 10
D-60318 Frankfurt
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200