



**Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

# Pascoleucyn® SL

## Tropfen, Mischung

Zur Anwendung bei Erwachsenen, Kindern und Säuglingen.

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

- Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht:**

1. Was ist Pascoleucyn® SL Tropfen und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pascoleucyn® SL Tropfen beachten?
3. Wie ist Pascoleucyn® SL Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pascoleucyn® SL Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. Was ist Pascoleucyn® SL Tropfen und wofür wird es angewendet?

Pascoleucyn® SL Tropfen ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten.

### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Pascoleucyn® SL Tropfen beachten?

Pascoleucyn® SL Tropfen darf nicht eingenommen werden: Wenn Sie allergisch gegen einen der in Abschnitt 6 genannten Wirkstoffe dieses Arzneimittels oder allergisch gegen Korbbliütler sind.

- von Alkoholkranken

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:** Die Anwendung von Pascoleucyn® SL Tropfen wird nicht empfohlen bei fortschreitenden Systemerkrankungen (wie Tuberkulose, Sarkoidose)  
• systemischen Erkrankungen des weißen Blutzellsystems (z.B. Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen)  
• Autoimmunerkrankungen [z.B. entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose]  
• Immundefizienz (AIDS/HIV-Infektionen)

Die Anwendung von Pascoleucyn® SL Tropfen wird nicht empfohlen bei Immunsuppression (z.B. nach Organ- oder Knochenmarkstransplantation).

Die Anwendung von Pascoleucyn® SL Tropfen bei Kindern unter 1 Jahr wird nicht empfohlen.

Bei Patienten mit atopischen Erkrankungen (z.B. Neurodermitis, allergisches Asthma, Heuschnupfen) besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko allergischer Reaktionen. Deshalb sollte Pascoleucyn® SL Tropfen von Patienten mit atopischen Erkrankungen nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Die Einnahme von Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut wird in Einzelfällen mit dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht.

Bei einer Langzeitanwendung (länger als 8 Wochen) wurde in einem Einzelfall eine Verminderung der weißen Blutzellen berichtet. Bei Fieber, das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39 °C ansteigt, bei Atemnot, eitrigem Auswurf sowie allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

**Einnahme von Pascoleucyn® SL Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln:** Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

**Einnahme von Pascoleucyn® SL Tropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Pascoleucyn® SL Tropfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:** Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Pascoleucyn® SL Tropfen enthält:** Dieses Arzneimittel enthält ca. 57 mg Alkohol (Ethanol) pro 5 Tropfen. Die Menge in 5 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 2 ml Bier oder 1 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

### 3. Wie ist Pascolecucyn® SL Tropfen einzunehmen?

Nehmen Sie Pascolecucyn® SL Tropfen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Anwendung bei Kindern:

Säuglinge im ersten Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit einem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis:

- bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich, je 1-2 Tropfen (maximal 10 Tropfen/Tag). Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

- bei chronischen Zuständen 1-3 mal täglich 1-2 Tropfen (maximal 5 Tropfen/Tag).

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kleinkinder bis unter 6 Jahren erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis:

- bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich 2-3 Tropfen (maximal 15 Tropfen/Tag).

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

- bei chronischen Zuständen 1-3 mal täglich 2-3 Tropfen (maximal 7 Tropfen/Tag).

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Kinder ab 6 bis unter 12 Jahren erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis:

- bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich 3-4 Tropfen (maximal 20 Tropfen/Tag).

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

- bei chronischen Zuständen 1-3 mal täglich 3-4 Tropfen (maximal 10 Tropfen/Tag).

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Art der Anwendung:** Pascolecucyn® SL Tropfen wird mit etwas Flüssigkeit eingenommen. Da die Aufnahme über die Mundschleimhaut die Wirkung intensiviert, sollten die Tropfen einige Zeit im Mund belassen werden.

**Dauer der Anwendung:** Pascolecucyn® SL Tropfen sollte nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Wenn Sie eine größere Menge von Pascolecucyn® SL Tropfen eingenommen haben als Sie sollten:** Wenn Sie eine größere Menge Pascolecucyn® SL Tropfen angewendet haben als Sie sollten, fragen Sie bitte einen homöopathisch erfahrenen Arzt oder Heilpraktiker. Grundsätzlich soll die Dosierungsempfehlung eingehalten werden.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Pascolecucyn® SL Tropfen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Mögliche Nebenwirkungen:** In Einzelfällen können bei Arzneimitteln mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Es wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

**Meldung von Nebenwirkungen:** Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. Wie ist Pascolecucyn® SL Tropfen aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen:** Keine besonderen.

Bei Pascolecucyn® SL Tropfen können auf Grund des hohen Gehaltes an Urntinkturen natürliche Trübungen und Ausflockungen auftreten. Bitte schütteln Sie in diesem Fall den Inhalt der Flasche kurz auf und bewahren Sie die Flasche nach Gebrauch stets gut verschlossen und vor Licht geschützt auf.

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z.B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de/arnzeimittelentsorgung](http://www.bfarm.de/arnzeimittelentsorgung).

### 6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**Was Pascolecucyn® SL Tropfen enthält:**

- Die Wirkstoffe sind: 10 g (= 11,1 ml) enthalten: Echinacea Ø 4 g, Baptisia Ø 2,35 g, Eupatorium perfoliatum Dil. D3 2,5 g, Thuja Dil. D1 1 g, Lachesis Dil. D8 0,15 g.

- Die sonstigen Bestandteile sind: Es sind keine sonstigen Bestandteile enthalten.

Enthält 66 Vol.-% Alkohol. 1 g Pascolecucyn® SL Tropfen entspricht 51 Tropfen.

**Wie Pascolecucyn® SL Tropfen aussieht und Inhalt der Packung:** Braune Glasflasche mit braungelber Flüssigkeit.

Pascolecucyn® SL Tropfen ist in Packungen mit 20 ml, 50 ml und 100 ml Mischung erhältlich. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:** Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH Schiffenberger Weg 55 · D-35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl D-35383 Giessen Tel.: +49 (0)641/7960-0 · Telefax: +49 (0)641/7960-109 · e-mail: [info@pascoe.de](mailto:info@pascoe.de).

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2023.

*Gute Besserung!*

