

sanotact®

Laktase Express 13.000



40 praktische Kautabletten in schicker Metalldose – ideal für unterwegs



Hochdosierte Expresswirkung:
13.000 FCC pro Tablette



Wirkung ab der 1. Minute



Einnahme ohne Wasser



Produktbeschreibung

sanotact® Laktase Express 13.000 Kautabletten - zur Verbesserung der Verdauung von Laktose (auch bekannt als Milchzucker) bei Personen, die mit Problemen bei der Verdauung von Laktose zu kämpfen haben.

Eine besonders schnelle Abhilfe schaffen die **sanotact® Laktase Express 13.000 Kautabletten**. Die enthaltene Laktase kann so bereits im Mund freigesetzt werden und die Wirkung tritt ab der 1. Minute ein.

Für viele Personen bedeutet ein Cappuccino im Café, ein Eis auf dem Heimweg oder eine Einladung bei Freunden zum Grillabend Lebensqualität und schöne Stunden. Diese Unbeschwertheit kann durch eine Laktoseintoleranz getrübt werden. Laktose ist in vielen Lebensmitteln, nicht nur in Milch, enthalten. Von Laktoseintoleranz betroffene Personen können den Milchzucker, der über die Nahrung aufgenommen wird, nur unvollständig oder gar nicht verdauen, da ihr Organismus das Enzym Laktase nicht oder nicht in ausreichender Menge selbst produzieren kann. Die unverdaute Laktose gelangt so in den Dickdarm, wo sie oft unmittelbar oder einige Stunden nach dem Verzehr von milchzuckerhaltigen Nahrungsmitteln zu unangenehmen Beschwerden wie Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen führt. Das körpereigene Enzym Laktase spaltet den Milchzucker in die für den menschlichen Körper verwertbaren Zucker Galaktose und Glucose. So können durch die Einnahme des notwendigen Enzyms die typischen Verdauungsbeschwerden wie Blähungen oder Durchfall vermieden werden. Da es sich um ein körpereigenes Enzym handelt, kann Laktase nicht überdosiert werden und es kommt zu keinem Gewöhnungseffekt.

Die schicke Metalldose ermöglicht bei Bedarf eine besonders diskrete Einnahme und passt in jede Tasche oder Rucksack und kann auch auf Reisen im Handgepäck Platz finden.

Durch die Einnahme von Laktase kann die körpereigene Laktaseproduktion nicht beeinflusst werden, sodass bei einem längeren oder überschüssigen Verzehr keine nachteiligen Wirkungen zu erwarten sind.
Der Grad der Laktoseintoleranz ist von Person zu Person unterschiedlich. Bitte informieren Sie sich über die Funktion der Laktase bei Ihrer Ernährung.

Laktose-Verarbeitung im Darm

mit Laktase



ohne Laktase



Zutaten / Nährstoffe

Zutaten: Dextrose (62 %), Maltodextrin, Laktase (14 %), Trennmittel
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren.

Inhaltsstoff	pro Tablette
Laktase	13.000 Laktase-FCC-Einheiten

Verzehrempfehlung

1 **sanotact® Laktase 13.000 Express** Kautablette unmittelbar vor (aber nicht auf nüchternen Magen) oder während des Verzehrs von milchzuckerhaltigen Produkten einnehmen. Der Bedarf an zuzuführender Laktase muss individuell festgelegt werden. Er richtet sich nach der körpereigenen Laktaseproduktion und der in Speisen und Getränken enthaltenen Menge an Milchzucker. Aber auch die Art der Nahrung – flüssig oder fest – ist zu beachten. Ebenso spielen die Verweildauer des Speisebreis im Verdauungssystem sowie der Zustand der Darmflora eine wichtige Rolle.